

## РЕЦЕНЗИЯ

### НА КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАР

«Периоперационное ведение пациентов с артериальной гипертензией»

(авторы: Баутин А.Е., Григорьев Е.В., Грицан А.И., Заболотских И.Б., Лебединский К.М.,  
Потиевская В.И., Руднов В.А., Субботин В.В.)

Представленные клинические рекомендации соответствуют текущим требованиям МЗ РФ. Рецензируемые рекомендации посвящены оптимизации медицинской помощи при проведении анестезии и в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Рекомендации базируются на европейских и всемирных руководствах и стандартах оказания помощи по данной проблеме. Уровни достоверности и убедительности доказательств, приведенных в клинических рекомендациях, соответствуют современным литературным данным.

В клинических рекомендациях приводятся: определение, классификация артериальной гипертензии, принципы стратификации периоперационного риска, особенности обследования пациентов с артериальной гипертензией, современные методы лечения неотложных состояний, принципы и особенности периоперационного ведения, включая антигипертензивную терапию, премедикацию, ведение интраоперационного и раннего послеоперационного периода. По своей структуре данные клинические рекомендации относятся к документам, определяющим современные стандарты диагностики состояния пациентов с артериальной гипертензией и стратегию периоперационного ведения. Безусловным достоинством рецензируемых рекомендаций является их адресность практическим анестезиологам-реаниматологам. Критерии качества могут быть использованы в любых медицинских учреждениях, соответствуют принципам доказательной медицины и адекватно расшифрованы в блок-схемах. Блок-схемы рекомендаций соответствуют критериям качества и могут быть надежно реализованы. Критерии качества, изложенные в рекомендациях, соответствуют указанным уровням оказания медицинской помощи.

профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии  
ФГАОУ ВО Первый МГМУ  
им. И.М.Сеченова Минздрава России

(Сеченовский Университет)  
доктор медицинских наук



А.М.Овечкин