

РЕЦЕНЗИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАР

«Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью»
(авторы: Бутров А.В., Горобец Е.С., Григорьев Е.В., Заболотских И.Б.,
Лебединский К.М., Лубнин А.Ю., Овезов А.М., Овечкин А. М., Трембач
Н.В., Щёголев А.В.).

Представленные клинические рекомендации соответствуют текущим требованиям МЗ РФ. Рецензируемые рекомендации посвящены оптимизации лечения пациентов с зависимостью от наркотических препаратов в периоперационный период. Уровни доказательности и убедительности разработанных рекомендаций соответствуют современным литературным данным.

Актуальность представленных рекомендаций не вызывает сомнений. Количество людей, принимающих наркотические препараты периодически или постоянно, неуклонно растет, как в нашей стране, так и в мире в целом, являясь острой медицинской и социальной проблемой. Текст рецензируемого документа содержит исчерпывающую информацию об этиологии и патогенезе всех изменений в организме, связанных с злоупотреблением наркотических веществ и значительно увеличивающих риск развития периоперационных осложнений. В клинических рекомендациях приведены основные принципы предоперационной оценки пациентов с зависимостью от опиоидов, кокаина, метамфетамина, гамма-гидроксибутирата, марихуаны, летучих токсических веществ. Приведенные рекомендации по интраоперационному ведению и послеоперационной терапии основаны на характере принимаемого наркотического средства и направлены на предупреждение характерных для данного заболевания осложнений.

В процессе рецензирования в рекомендации по оценке болевого синдрома шкала Algoplus была заменена на более валидизированную шкалу Behavioral Pain Scale, что позволит лучше объективизировать данный мониторинг.

По своей структуре данные клинические рекомендации являются документом, определяющим современные стандарты диагностики и ведения пациентов, страдающих наркотической зависимостью. Критерии качества могут быть использованы в ЛПУ, соответствуют принципам доказательной медицины и адекватно расшифрованы в блок-схеме. Блок-схемы соответствуют критериям качества и могут быть реализованы в российских ЛПУ. Критерии качества, изложенные в рекомендациях, соответствуют указанным уровням оказания медицинской помощи.

Профессор кафедр нервных болезней
и анестезиологии-реаниматологии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет»
Минздрава России,
д.м.н., профессор

Белкин А.А

31.07.2018



А.А. Белкин
заместитель директора
научно-исследовательского
отдела

31.07.18